

► Cabinet Dentaire de la Métairie

Dr Olivier JOIE

📍 21 Boulevard de la Perche 17200 ROYAN

☎ Tel. : +33 5 46 39 96 12

🌐 dr-joie-olivier.chirurgiens-dentistes.fr

Le tabac et votre santé bucco-dentaire

Si les fumeurs savent que leur santé est menacée par le tabac, peu connaissent les dégâts qui se développent à bas bruit dans leur bouche.

Ce sont souvent les colorations dues aux dépôts de nicotine sur les dents, et aussi sur les prothèses et obturations esthétiques, qui poussent le patient fumeur à consulter. Les dégâts jusque-là invisibles peuvent s'avérer importants.

LES GINGIVITES

Pour le fumeur, apparemment tout va bien : pas de gencive enflée ni de saignement au brossage. Or, fumer masque un certain nombre de symptômes et, chez le fumeur, les réactions naturelles à la gingivite sont ainsi camouflées.

- > La nicotine stimule la libération d'adrénaline ce qui entraîne une diminution du calibre des vaisseaux.
- > Le monoxyde de carbone est responsable d'une baisse du transport d'oxygène dans les tissus.

Finalement, la mauvaise irrigation des gencives par un sang appauvri en oxygène entraîne une diminution des signes inflammatoires et des saignements, retardant ainsi le diagnostic de la pathologie et la mise en place d'un traitement.



LES INTERVENTIONS CHIRURGICALES

Dans le cas d'une intervention chirurgicale (extraction dentaire, pose d'implant...) il est recommandé de ne plus fumer car la diminution de la vascularisation de la gencive, et de l'os de support, entraîne une moins bonne cicatrisation. Le risque de suites post-opératoires douloureuses est augmenté à cause de la difficulté pour le caillot sanguin à se former ; l'hémostase est ralentie et les muqueuses cyanosées.



LE BLANCHIMENT DENTAIRE

Il est bon de savoir que le tabac n'est pas responsable de la formation de tartre mais de sa coloration, et qu'une séance de détartrage permet d'éliminer ces taches. Cependant, si l'on envisage un traitement de blanchiment des dents, il faut envisager d'arrêter de fumer, au moins pendant la durée du traitement et si possible après !

À SAVOIR


Une chirurgie buccale peut ainsi être une excellente occasion pour prendre la décision de ne plus fumer, avec un réel bienfait tant pour votre santé bucco-dentaire que pour votre santé en général.



Χαλαρή αίσθηση στο στόμα, που μπορεί να οφείλεται στην χρήση ορισμένων φαρμάκων ή στην αλλαγή της διατροφής. Η κατάσταση αυτή είναι συνήθως προσωρινή και υποχωρεί μόνη της με την πάροδο του χρόνου.




Ασθένειες του στομάχου, όπως η γαστρίτις ή η γαστροεπισπελμική παλινδρομική νόσος, μπορεί να προκαλέσουν αίσθημα καύσου ή να επηρεάσουν την πέψη των τροφίμων. Η αντιμετώπιση της αιτίας είναι απαραίτητη.




Ασθένειες των ούλων, όπως η κίτρινη κίτρινη ή η κίτρινη κίτρινη, μπορεί να προκαλέσουν αίσθημα καύσου ή να επηρεάσουν την πέψη των τροφίμων. Η αντιμετώπιση της αιτίας είναι απαραίτητη.

“ Χρησιμοποιώντας ορισμένα φάρμακα, όπως τα αντιβιοτικά, μπορεί να προκαλέσει αίσθημα καύσου ή να επηρεάσει την πέψη των τροφίμων. Η αντιμετώπιση της αιτίας είναι απαραίτητη. ”



XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX

- > Χρησιμοποιώντας ορισμένα φάρμακα, όπως τα αντιβιοτικά, μπορεί να προκαλέσει αίσθημα καύσου ή να επηρεάσει την πέψη των τροφίμων. Η αντιμετώπιση της αιτίας είναι απαραίτητη.
- > Χρησιμοποιώντας ορισμένα φάρμακα, όπως τα αντιβιοτικά, μπορεί να προκαλέσει αίσθημα καύσου ή να επηρεάσει την πέψη των τροφίμων. Η αντιμετώπιση της αιτίας είναι απαραίτητη.
- > Χρησιμοποιώντας ορισμένα φάρμακα, όπως τα αντιβιοτικά, μπορεί να προκαλέσει αίσθημα καύσου ή να επηρεάσει την πέψη των τροφίμων. Η αντιμετώπιση της αιτίας είναι απαραίτητη.



XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX

- > Χρησιμοποιώντας ορισμένα φάρμακα, όπως τα αντιβιοτικά, μπορεί να προκαλέσει αίσθημα καύσου ή να επηρεάσει την πέψη των τροφίμων. Η αντιμετώπιση της αιτίας είναι απαραίτητη.
- > Χρησιμοποιώντας ορισμένα φάρμακα, όπως τα αντιβιοτικά, μπορεί να προκαλέσει αίσθημα καύσου ή να επηρεάσει την πέψη των τροφίμων. Η αντιμετώπιση της αιτίας είναι απαραίτητη.
- > Χρησιμοποιώντας ορισμένα φάρμακα, όπως τα αντιβιοτικά, μπορεί να προκαλέσει αίσθημα καύσου ή να επηρεάσει την πέψη των τροφίμων. Η αντιμετώπιση της αιτίας είναι απαραίτητη.

À SAVOIR

Χρησιμοποιώντας ορισμένα φάρμακα, όπως τα αντιβιοτικά, μπορεί να προκαλέσει αίσθημα καύσου ή να επηρεάσει την πέψη των τροφίμων. Η αντιμετώπιση της αιτίας είναι απαραίτητη.

Χρησιμοποιώντας ορισμένα φάρμακα, όπως τα αντιβιοτικά, μπορεί να προκαλέσει αίσθημα καύσου ή να επηρεάσει την πέψη των τροφίμων. Η αντιμετώπιση της αιτίας είναι απαραίτητη.



